

Dégénérescence d'un angiome géant de la lèvre inférieure en carcinome épidermoïde.

O.Laajili*, H.Hablani, S.Hammemi, H.BenMessouad, F.Karray, M.Abdelmoula
Service de chirurgie maxillo-faciale et esthétique de la face, CHU Habib Bourguiba Sfax, Tunisie.

*ons12345@hotmail.fr

Introduction:

Les angiomes constituent un groupe hétérogène de pathologies caractérisées par des ectasies vasculaires qui peuvent toucher tous les organes mais l'atteinte cutanée est de loin la plus fréquente. Outre les complications classiques telles que les ulcérations, le risque hémorragique et le préjudice esthétique qu'ils entraînent, nous rapportons un cas de dégénérescence d'un angiome de la lèvre inférieure en un carcinome épidermoïde suite à des ulcérations répétitives.

Matériel et Méthode:

Il s'agit d'un homme âgé de 65ans, ayant un angiome de la lèvre inférieure qui consulte pour une ulcération persistante malgré le traitement symptomatique. Une dégénérescence carcinomateuse a été suspecté devant la tendance à l'aggravation de la lésion ainsi que la durée de l'évolution. La biopsie a confirmé le diagnostic. Le traitement était chirurgical : évidement ganglionnaire cervical bilatéral, une exérèse tumorale emportant l'angioime de la lèvre suivie d'une reconstruction par un lambeau anté-brachial radial libre. Une radiothérapie post-opératoire a été réalisée.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

1 et 2: Aspect de la tumeur,
3: Exérèse tumorale emportant l'unité labiale inférieure,
4 et 5: Levé du lambeau chinois,
6 et 7: couverture de la PDS et anastomose vasculaire,
8: Aspect à 1 mois,
9 et 10: Aspect après la fin de la radiothérapie externe.

Discussion:

Les angiomes présentent des complications classiques telles que les ulcérations, le risque hémorragique et le préjudice esthétique qu'ils entraînent surtout s'ils sont de grande taille. La transformation maligne, bien qu'elle soit exceptionnelle, doit être toujours suspectée et amène sans délai à une biopsie pour confirmer le diagnostic et poser une attitude thérapeutique.

Conclusion:

La survenue d'un carcinome épidermoïde sur un angiome préexistant est assez rare. Chez ce patient, la chirurgie a permis à la fois de traiter la tumeur ainsi que d'améliorer l'aspect disgracieux de l'angiome. ***(pas de conflits d'intérêts).***