

Le syringome chondroïde labial supérieur : à propos d'un cas

AF. Habimana*^a (Dr), K. Harmali*^a (Dr), S. Benwadih*^a (Dr), M. Boulaadas^a (Pr)

^a Faculté de Médecine et Pharmacie Mohamed V de Rabat, Rabat, MAROC

*bricosn1@gmail.com

Introduction

Le syringome chondroïde est une tumeur cutanée rare de bon pronostic et d'évolution indolente, caractérisée par une double composante épithéliale et mésenchymateuse pouvant mimer d'autres pathologies. Nous rapportons ici le cas d'un patient avec une localisation labiale supérieure.

Observation

Il s'agit d'un patient âgé de la soixantaine sans antécédents notoires qui consultait pour excroissance cutanée de labiale supérieure gauche indolore non saignant au contact ferme évoluant depuis environ 3 ans. Elle mesurait 1*1,5 cm.

Une exérèse chirurgicale sous anesthésie locale a été réalisée en première intention.

L'histologie après immunohistochimie a conclu au diagnostic de syringome chondroïde bénin.

A un mois après exérèse aucune récurrence n'a été constatée.

Discussion

Décrit pour la première fois en 1859 par Billroth, initialement sous le terme de « *tumeur mixte cutanée* », c'est en 1961, que Hirsch et Helwig la dénomment « *syringome chondroïde* » du fait d'une composante stromale « *cartilage-like* » et de la présence de glandes sudorales (eccrines et apocrines).

Le syringome chondroïde peut être évocateur d'un carcinome basocellulaire, un naevus, un pilomatricome ou autres tumeurs annexielles.

Son diagnostic est histologique faisant généralement recours à un complément immunohistochimique recherchant la présence d'un contingent myoépithélial.

Le traitement repose sur l'exérèse complète avec une marge de sécurité de 3 mm. Une exérèse incomplète imposant un suivi régulier car il existe un risque de récurrence et de transformation maligne.

Conclusion

Tumeur cutanée relativement rare, le syringome chondroïde est de diagnostic l'histologique et une chirurgie d'exérèse large en est le traitement et prévient les récurrences et la transformation maligne.

Bibliographie

1. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jfo.2015.03.028>
2. <http://dx.doi.org/10.1016/j.annpat.2015.04.002>
3. Thèse N°159 /2014 : « *Le Syringome chondroïde bénin de l'orbite: à propos de un cas et revue de la littérature* » présentée par Mme Bochra CHEMLALI à l'université Mohamed V de Rabat en 2014

Déclaration de liens d'intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.



Avant chirurgie



À 3 semaines post chirurgie